

IST – Infections Sexuellement Transmissibles

Pour y voir plus clair ...



	Symptômes	Transmission	Complications ou répercutions possible	Traitements	Diminuer les risques de transmission	Incubation
Hépatite A	Fièvre, nausées, jaunisse Disparition des symptômes après quelques semaines	Par contacts sexuels la transmission se fait lors de rapports bouche anus	Dans de rares cas : hépatite fulminante et atteintes sévères au foie nécessitant une greffe	Aucun	Vaccination	15 à 45 jours
Hépatite B	-inexistant au niveau génital -Fièvre, fatigue, jaunisse dans 10% des cas.	-Par contact sexuel et par les liquides organiques (sang, liquide pré-éjaculatoire, sperme et sécrétions vaginales) -Au cours d'un tatouage ou d'un piercing dans des conditions non stériles. -Par lésions de la peau si contact avec du sang. -Par les muqueuses vaginales, buccales et anales.	Maladie graves du foie : cirrhose et/ou cancer	Il existe un vaccin contre l'hépatite B	-vaccination -Dépistage -Préservatif	De 1 à 6mois
Hépatite C	Epuisement fatigue, perte d'appétit, troubles de l'appareil digestif et fièvre. Dans 10 à 15% des cas une jaunisse.	Contact avec le sang même en petite quantité. Notamment lors d'échange de seringue usagée ou du matériel de préparation du shoot. Au cours d'un tatouage ou d'un piercing dans des conditions non stériles. le risque de transmission sexuel est faible.	L'infection devient chronique chez environ 80% de cas. Entre 10 à 20% des porteurs chroniques font une cirrhose et 1 à 5% des cas évolues en cancer du foie.	Il existe un traitement médicamenteux lourd. Pas de vaccin.	Utiliser du matériel d'injection stérile et à usage unique ainsi que le matériel de préparation. Ceux qui pratiquent une sexualité hard doivent être particulièrement vigilants aux saignements et blessures.	15 à 150 jours.
Herpès génital	Au niveau des organes génitaux de l'homme et de la femme: brûlures, petites cloques, plaies et démangeaisons.	-Par contact sexuel entre les muqueuses même sans pénétration, ou par le baiser. -Transmission pendant l'accouchement de la mère à l'enfant	Conséquences graves pour le nouveau né.	Antiviraux pour diminuer la contagiosité	-Pendant les poussées abstinence sexuelle et traitement -Préservatifs	De 2 à 21 jours. ensuite réactivation périodique

	Symptômes	Transmission	Complications ou répercussions possible	Traitements	Diminuer les risques de transmission	Incubation
Syphilis	-Petite plaie ou chancre situé sur les organes génitaux ou au niveau de la bouche, de l'anus et souvent accompagné de ganglions.	-Par voie sexuelle, même le contact peau à peau suffit. -Par le baiser, s'il y a présence d'un chancre sur la bouche.	Non traiter, la syphilis peut provoquer des atteintes graves au cerveau et au cœur	antibiotiques pour les deux partenaires.	Pendant le traitement : abstinence sexuelle ou, selon les cas, rapport protégé.	De 10 jours à 3 mois
Blennorragie ou gonorrhée	-Pour les hommes écoulement de pus à l'extérieur de la verge, avec une sensation de brûlures en urinant ou encore appelée « chaude pisse ». -Pour les femmes inexistant ou minimales : pertes vaginales picotement urinaire.	-Contact sexuel génital, oral ou anal avec une personne infectée. -Transmission de la mère à l'enfant pendant l'accouchement.	-Chez les hommes : baisse de la fertilité. -Chez les femmes : infection des trompes pouvant entraîner la stérilité ou des grossesses extra-utérines.	antibiotiques pour les deux partenaires.	Pendant le traitement abstinence ou rapport protégé.	De 2 à 7 jours
Chlamydia	La plupart du temps inexistant. Parfois des picotements urinaires, douleurs au bas-ventre ou pendant les rapports sexuels. -Chez les femmes : pertes vaginales. -Chez les hommes : sécrétions à l'extrémité de la verge.	-Contact avec une personne infectée. -Transmission de la mère à l'enfant au cours de l'accouchement.	Chez les hommes : baisse de la fertilité. -Chez les femmes : infection des trompes pouvant entraîner la stérilité ou des grossesses extra-utérines	Antibiotiques	Pendant le traitement : abstinence sexuelle ou rapport protégé.	De 2 à 6 semaines (mais peut aller jusqu'à 3 mois)
Candidose	Chez la femme : irritation, rougeur et démangeaison de la région vulvaire et vaginale. Ecoulement vaginal. Chez l'homme : rougeurs et démangeaisons	-En général, ne se transmet pas sexuellement. Se trouve dans la flore naturelle de la femme.	Aucune	antifongiques sous forme de suppositoires vaginaux, crèmes vaginales	Réduire le taux d'humidité dans la région vaginale.	Variable

	Symptômes	Transmission	Complications ou répercussions possible	Traitements	Diminuer les risques de transmission	Incubation
Condylomes ou papilloma virus	Apparition de petites verrues sur les organes génitaux, sur l'anus, dans le rectum et parfois dans la bouche, qui peuvent être rose, rouges, blanches ou grise. Chez la femme infection du col de l'utérus : le plus souvent asymptomatique	Contact direct peau à peau, frottement avec une personne infectée.	Infection du col de l'utérus. Développement possible d'un cancer du col de l'utérus.	Traitement local.	Préservatif si lésions sur le sexe. Surveillance prolongée afin de dépister toute récurrence. Vaccination pour les adolescentes.	De plusieurs semaines à plusieurs mois.
Trichomonas	Chez la femme. enflure et douleurs dans la région du vagin et douleurs au vagin. Pertes vaginales démangeaison. Chez l'homme absence de symptômes écoulement léger du pénis sensation de brûlure en urinant irritation et douleurs dans la région du gland.	Par contact sexuel	Chez la femme risque d'accouchement prématuré.	antibiotique.	Prendre soins de soi et de son hygiène intime.	De 4 à 28 jours.
LGV : Lympho-granulomatose vénérienne	-dans les premiers jours après l'infection apparaît une petite blessure indolore. Ensuite apparaissent douleurs et fièvre.	Par contacte entre muqueuses ou liquide sexuel.	non traité c'est une infection grave pouvant causer de sérieux problèmes de santé.	En début d'infection : antibiotique. Au delà, une intervention chirurgicale peut être indispensable ainsi que des antibiotique.	Pour les personnes qui ont des pratiques sexuelles hard et qui utilisent des accessoires : se protéger et ainsi qu'une bonne hygiène des accessoires et des mains.	2 à 60 jours